

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
ACIDO CARGLUMICO	Trattamento dell'iperammonemia dovuta alla deficienza di N-acetilglutamato sintasi.	INTERNISTA, PEDIATRA, NEUROLOGO	OSPEDALIERA
ADEFOVIR DIPIVOXIL	Trattamento dell'epatite cronica B negli adulti con: •epatopatia compensata con evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati di alanina aminotransferasi (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e fibrosi epatica. •epatopatia scompensata	SPECIALISTI OSPEDALIERI O INFETTIVOLOGO	OSPEDALIERA/SERD ASL
AMBRISENTAN	Ipertensione polmonare arteriosa (PAH).E' un ERA (potente e selettivo Antagonista dei Recettori dell'Endotelina), che appartiene alla classe dell'acido propanoico, selettivo per il recettore dell'endotelina A (ET A), localizzato principalmente sulle cellule della muscolatura liscia vascolare e dei miociti cardiaci. Ciò previene l'attivazione endotelina-mediata del secondo messaggero che determina la vasocostrizione e la proliferazione delle cellule muscolari lisce. La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo.	cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo	OSPEDALIERA
ANAGRELIDE CLORIDRATO	Indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti a rischio (che presentino una o più delle caratteristiche riportate di seguito: •Età > 60 anni, oppure •Conta piastrinica > 1.000 x 10 ⁹ /l, oppure •Storia di eventi tromboemorragici) con trombocitemia essenziale (TE), i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia.	INTERNISTA, EMATOLOGO	OSPEDALIERA
BETAINA	Trattamento aggiuntivo dell'omocistinuria, che comporta deficit o difetti di: •cistationina beta-sintetasi (CBS), •5,10-metilentetraidrofolato reductasi (MTHFR), •metabolismo del cofattore cobalamina (cbl). Cystadane deve essere usato come integratore di altre terapie, quali vitamina B6 (piridossina), vitamina B12 (cobalamina), folato e di una dieta specifica.	INTERNISTA, PEDIATRA, EPATOLOGO, NEFROLOGO	OSPEDALIERA
BEXAROTENE	Trattamento delle manifestazioni cutanee nei pazienti con linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) di grado avanzato, refrattari ad almeno un trattamento sistemico precedente.	internista, oncologo, ematologo	OSPEDALIERA

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
BOSENTAN MONOIDRATO	Antagonista dei recettori dell'endotelina (ERA sia ETA_A che ETA_B). Il bosentan abbassa la resistenza vascolare sia polmonare che sistemica con conseguente maggiore gittata cardiaca senza però aumentare la frequenza cardiaca. Trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH): •ipertensione arteriosa polmonare primitiva (idiopatica e familiare) •ipertensione arteriosa polmonare secondaria a sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa •ipertensione arteriosa polmonare associata a shunt sistemico-polmonari congeniti e Sindrome di Eisenmenger. Tracleer è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive.		OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASL
BUPRENORFINA/NALOXONE	Trattamento sostitutivo nella dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico. Il ruolo del componente naloxone è quello di scoraggiarne l'uso improprio per via endovenosa. L'uso del farmaco è indicato in adulti e adolescenti di età superiore ai 15 anni che abbiano dato il proprio consenso al trattamento della loro situazione di tossicodipendenza.	SERD ASL	SERD ASL
CAPECITABINA	Terapia adiuvante nei pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio III (Dukes C); tumore del colon-retto metastatico; trattamento di prima linea del tumore gastrico avanzato in associazione con un regime a base di platino; in associazione a docetaxel è indicato nel trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve avere incluso un'antraciclina. Inoltre Xeloda è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un'antraciclina o per le quali non è indicata un'ulteriore terapia con antracicline.	INTERNISTA, ONCOLOGO	OSPEDALIERA
DABIGATRAN ETEXILATO	Prevenzione primaria di episodi tromboembolici in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.	EMATOLOGO, ORTOPEDICO	OSPEDALIERA
DEFERASIROX	E' indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major > 6 anni. E' anche indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti: •in pazienti con altre anemie, •in pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni, •in pazienti con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati).	EMATOLOGO	OSPEDALIERA
DEFERIPRONE	Trattamento dell'accumulo di ferro nei pazienti affetti da talassemia maggiore quando la terapia con deferoxamina è controindicata o non adeguata.	EMATOLOGO	OSPEDALIERA
DORNASE ALFA	Trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica con una capacità vitale forzata (CVF) superiore al 40% di quella prevista e con un'età maggiore di 5 anni per migliorare la funzionalità polmonare	PNEUMOLOGO, INTERNISTA, CARDIOLOGO, GASTROENTEROLOGO	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASL
ENTECAVIR	Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi. Questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi	INTERNISTA, INFETTIVOLOGO, GASTROENTEROLOGO	OSPEDALIERA/SERD ASL

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
FLUDARABINA FOSFATO	Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare. Il trattamento di prima linea con Fludara orale deve essere iniziato solo in pazienti con patologia avanzata, stadio Rai III/IV (stadio Binet C) o RAI I/II (stadio Binet A/B), dove il paziente mostra i sintomi relativi alla malattia o è evidente la progressione della malattia.	INTERNISTA, ONCOLOGO, EMATOLOGO	OSPEDALIERA
ILOPROST	Trattamento di pazienti con ipertensione polmonare primaria classificata come III classe funzionale NYHA, per il miglioramento della capacità fisica e dei sintomi	cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASI
IMATINIB MESILATO	Leucemia Mieloide Cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di MO non è considerato come trattamento di prima linea. LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica. Tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al kit (CD 117).	internista, oncologo, ematologo	OSPEDALIERA
LINEZOLID	Polmonite nosocomiale da Gram+. Polmonite acquisita in comunità da Gram+. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli da Gram+.	internista, specialista malattie infettive (microbiologo, infettivologo), ematologo	OSPEDALIERA
MERCAPTAMINA BITARTTRATO	Cistinosi nefropatica manifesta. La cisteamina riduce l'accumulo della cistina in alcune cellule (ad esempio leucociti e cellule muscolari ed epatiche) di pazienti con cistinosi nefropatica e, se il trattamento è iniziato precocemente, ritarda la comparsa di insufficienza renale.	pediatra, nefrologo	OSPEDALIERA
MICOFENOLATO MOFETILE	Profilassi del rigetto acuto da allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi	INTERNISTA, PEDIATRA, IMMUNOLOGO, EMATOLOGO	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASI
MICOFENOLATO SODICO	Profilassi del rigetto acuto da allotrapianto renale in associazione con ciclosporina e corticosteroidi	INTERNISTA, PEDIATRA, IMMUNOLOGO, EMATOLOGO	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASI
MIGLUSTAT	Trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1 di pazienti adulti con sintomatologia da lieve a moderata. Può solo essere utilizzato per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non è appropriata. Trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C.	INTERNISTA, PEDIATRA, NEUROLOGO	OSPEDALIERA
MITOTANO	Trattamento sintomatico del carcinoma corticosurrenalico avanzato (non resecabile, metastatico o recidivo). L'effetto del Lysodren sul carcinoma corticosurrenale non funzionale non è stato determinato	internista, oncologo	OSPEDALIERA
PILOCARPINA CLORIDRATO	1. Riduzione della sintomatologia da ipofunzione della ghiandola salivare in pazienti con xerostomia grave dopo irradiazione per neoplasie cervico cefaliche. 2. Trattamento della sintomatologia da secchezza della bocca e da secchezza della congiuntiva nei pazienti affetti dalla sindrome di Sjögren.	internista, oncologo, oculista, gastroenterologo	OSPEDALIERA

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
POSACONAZOLO	<p>Aspergillosi invasiva in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolleranti a questi farmaci; fusariosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o in pazienti intolleranti ad amfotericina B; cromoblastomicosi e micetoma in pazienti con malattia refrattaria a itraconazolo o in pazienti intolleranti ad itraconazolo; coccidioidomicosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo o in pazienti intolleranti a questi farmaci; candidiasi orofaringea: come terapia di prima linea in pazienti con malattia grave o immunocompromessi, in cui ci si aspetta scarsa risposta ad una terapia topica. La refrattarietà è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di 7 giorni con dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.</p> <p>Pazienti in chemioterapia per induzione della remissione di leucemia mieloblastica acuta (AML) o sindromi mielodisplastiche (MDS) per le quali si prevede una neutropenia prolungata e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive; soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) in terapia immunosoppressiva ad alto dosaggio per malattia del trapianto contro l'ospite e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive.</p>	internista, specialista malattie infettive, ematologo	OSPEDALIERA
RIBAVIRINA/VIRAZOLE	VIRAZOLE polvere per soluzione per nebulizzatore è indicato solo nel trattamento di bronchioliti virali gravi da virus sinciziale respiratorio nei primi giorni di infezione	internista, infettivologo, gastroenterologo	OSPEDALIERA
RIBAVIRINA/ COPEGUS	Epatite cronica C in associazione con peginterferone alfa-2a o con interferone alfa-2a. L'associazione con peginterferone alfa-2a o interferone alfa-2a è indicata in pazienti adulti che siano positivi per l'HCV-RNA del siero, compresi i pazienti con cirrosi compensata. L'associazione con peginterferone alfa-2a è indicata anche in pazienti che presentano una co-infezione da HIV clinicamente stabile, compresi i pazienti con cirrosi compensata. Copegus, in associazione con peginterferone alfa-2a, è indicato nei pazienti mai trattati in precedenza e nei pazienti che abbiano fallito un precedente trattamento con interferone alfa (pegilato o non pegilato) in monoterapia o in associazione con ribavirina.	internista, infettivologo, gastroenterologo	OSPEDALIERA/SERD ASL

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
RIBAVIRINA (REBETOL/Ribavirina Teva)	Epatite cronica C (HCV) in adulti, bambini di 3 anni e più e adolescenti in terapia combinata con peginterferone alfa-2b o interferone alfa-2b. Pazienti mai trattati in precedenza <i>Pazienti adulti:</i> in associazione con interferone alfa-2b o peginterferone alfa-2b per il trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C non trattati in precedenza, senza scompenso epatico, con elevata alanina aminotransferasi (ALT), con presenza di epatite-C da acido ribonucleico virale (HCV-RNA). In associazione con peginterferone alfa-2b, inclusi anche pazienti con cirrosi compensata e/o con coinfezione da IHV clinicamente stabile. <i>Bambini di 3 anni e più e adolescenti:</i> in regime di associazione con peginterferone alfa-2b o interferone alfa-2b, per il trattamento di bambini dai 3 anni in su e adolescenti, affetti da epatite cronica C, mai trattati in precedenza, senza scompenso epatico, e con presenza di HCV-RNA. Pazienti precedentemente trattati <i>Pazienti adulti:</i> in associazione con interferone alfa-2b per il trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C che abbiano risposto in precedenza alla monoterapia con l'interferone alfa (con normalizzazione delle ALT al termine del trattamento) ma che abbiano successivamente recidivato. In associazione con peginterferone alfa-2b, per il trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C in cui un precedente trattamento di associazione con interferone alfa (pegilato o non pegilato) da solo o in associazione con ribavirina.	internista, infettivologo, gastroenterologo	OSPEDALIERA/SERD ASL
RILUZOLO	Indicato per prolungare la vita o posticipare il ricorso alla ventilazione assistita dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Non è stato evidenziato un effetto terapeutico sulla funzionalità motoria e polmonare, sulle fascicolazioni, sulla forza muscolare e sui sintomi motori. Non si è dimostrato efficace negli stadi più avanzati della SLA e non deve essere usato in pazienti con altre malattie del	internista, neurologo	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASL
RIVAROXABAN	Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio.	ematologo, ortopedico	OSPEDALIERA
SAPROPTERINA DICLORIDRATO	Trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in pazienti adulti e pediatrici al di sopra dei 4 anni di età affetti da fenilchetonuria (PKU) e/o con carenza di tetraidrobiopterina (BH4) che hanno mostrato una risposta al trattamento.	SPECIALISTA Ospedaliero	OSPEDALIERA
SILDENAFIL CITRATO	Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.	cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASL
SITAXENTAN SODICO	Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzionale III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.	cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo. 23/12/2010 Nota AIFA Informativa Importante sul medicinale Thelin (Sitaxentan sodium): Informazioni importanti di sicurezza riguardanti il ritiro dal mercato mondiale del medicinale Thelin a seguito di segnalazioni di grave danno epatico	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASL

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	MEDICO PRESCRITTORE	TIPO DI EROGAZIONE
SODIO FENILBUTIRRATO	Terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea, compresa la carenza della sintetasi carbamilfosfatica, della transcarbamilasi dell'ornitina o della sintetasi arginino-succinica. È indicato per tutti i pazienti con comparsa neonatale (mancanza totale di enzimi, che si manifesta nei primi 28 giorni di vita). È indicato anche in pazienti con manifestazione tardiva della malattia (carenza enzimatica parziale, che si presenta dopo il primo mese di vita) e che hanno una storia di encefalopatia iperammonemica.	internista, pediatra, neurologo	OSPEDALIERA
SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	Bondronat è indicato per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee.	internista, ortopedico, oncologo	OSPEDALIERA
TEGAFUR/URACILE	Trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon retto in combinazione con calcio folinatc	internista, oncologo	OSPEDALIERA
TELBIVUDINA	Trattamento dell'epatite cronica B in pazienti adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale, con livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi	internista, infettivologo, gastroenterologo	OSPEDALIERA/SERD ASL
TEMOZOLAMIDE	Trattamento di pazienti adulti con glioblastoma multiforme di prima diagnosi in concomitanza a radioterapia (RT) e in seguito come monoterapia e in pazienti pediatrici di età ≥ 3 anni, adolescenti e adulti con glioma maligno, quale il glioblastoma multiforme o l'astrocitoma anaplastico, che manifestino recidiva o progressione dopo la terapia standard.	internista, oncologo	OSPEDALIERA
TOBRAMICINA	Terapia prolungata dell'infezione polmonare cronica da Pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica, di età non inferiore ai 6 anni.	internista, infettivologo, pneumologo, pediatra	OSPEDALIERA/ Servizio Governo Area Farmaceutica ASI
TOPOTECAN CLORIDRATO	Trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea	oncologo	OSPEDALIERA
VINORELBINA BITARTRATO	Carcinoma polmonare non a piccole cellule. Carcinoma mammario metastatico.	internista, oncologo, ematologo	OSPEDALIERA
VORICONAZOLO	Agente antimicotico triazolico ad ampio spettro indicato per: Trattamento dell'aspergillosi invasiva. Trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici. Trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei). Trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp. Deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.	internista, specialista malattie infettive, ematologo	OSPEDALIERA
ZINCO ACETATO	Trattamento del morbo di Wilson.	internista, pediatra, epatologo, neurologo, neuropsichiatra	OSPEDALIERA